

亦此間モ金澤ヲ去ル四里許ノ村里ニ横位置ノ産アリ教諭山田謙治君ヲ迎
エタレト途中心ニテ死報ニ接シ歸院セリ此婦モ三回ノ分娩ヲ經タル者ニシ
テ畢竟頻産婦人及ヒ勞働社會ニ多キヲ想像スルヲ得ルナラン

○黴毒患者ノ奇症

石川縣金澤病院醫員
外科掛

瀬尾順四郎報

石川縣金澤市堅町八十九番地現住

富山縣越中礪波郡内島村産

浴湯營業家族

内 島

三十七歲

私カ唯今はニ引誘シタル患者及ヒ其病歴ハ過般外科醫長木村孝藏君ノ實
驗ニシテ其許諾ヲ得テ諸君ニ報告スルコトナレハ先ツ同君ニ向ツテ禮拜
シ併セテ患者ノ勞ヲ謝ス

〔既往症〕右ハ天資強壯嘗テ記スヘキ疾病ニ罹リシヲナク然ルニ今ヲ去ルヲ五年前

左腹壁胃部ニ於テ輕度ノ疼痛ヲ起シ遂次日ヲ經ルニ從テ該部ニ硬結ヲ觸
レ外部ヘ腫張スレモ變色及破潰ノ發現ナク只タ硬結物ハ次第ニ蔓延シ疼
痛ノ度ハ稍ヤ加ワリ此ノ如ク經過スルヲ三年餘昨年十月ニ至リ食欲漸次
減損シ食物ヲ攝レハ直ニ嘔吐シ加之腹痛ヲ伴ヒ時々下痢ヲ併發ス斯ク月
ヲ累ヌルニ從ヒ全身衰弱シ疲勞ヲ加ヘ愈今年ノ春ニ至リ患部ノ腫起尙ホ一
層増大シ橫徑五寸五分
幅四寸計リ其硬結部ノ最高隆點ニ於テ皮膚ニ浸潤性ノ紅ヲ潮
スルヲ二寸四方計リ其他當年春頃ヨリハ右ノ肘關節ノ后部ニ於テ疼痛ヲ
喚起シ次テ此部モ腫起潮紅疼痛ヲ發スル等此ヲノ諸兆日ヲ經ルニ從テ増
進シ或ハ發熱或ハ惡寒シ肘關節周圍ノ蜂窩
熾炎ノ如シ爲メニ安眠スルヲ不能依テ彼樣
ヲ經過二十日間計ニシテ切開ヲ乞ヒ膿ヲ洩セシヨリ一時ニ疼痛等ノ惡兆
ハ消退シタレモ爾後慢性ノ潰瘍トナリ不瓦ノ肉芽ヲ發生シ惡臭ヲ有スル膿
ヲ洩シテ止マス又タ左腹壁胃部ノ者モ本年四月頃ヨリ漸次赤色ハ濃厚ト
ナリ光澤ヲ放シ炎性兆候ヲ加ヘ最高隆點ニ於テ破潰シ小ナル穿孔ヲ作り
之ヨリモ同ク惡臭ヲ有スル膿ヲ漏シ穿孔内ハ空洞樣トナリ此時ニ當テハ

穿孔部嫩紫色ヲ現セリ此ト同時ニ背部第六背椎部ニモ疣狀ノ固結物ヲ生シ之レモ漸次疼痛ヲ起シ且ツ浸潤性ノ紅ヲ潮スルノミナラス其大サ長徑二寸計右季肋部ノ前部及後部ニモ長サ一寸徑計ヲ有スル橢圓形ノ浸潤性潮紅固結セルヲ現シ左右ノ肩胛棘部ニモ亦タ長徑三寸幅徑二寸計ノ同様物ヲ現セリ而シテ皆共ニ疼痛ヲ發シ右脇骨前上棘部ニモ同様物ヲ生シ同兆候ヲ現セリ就中第六背椎ノ者ハ六月下旬ニ至リ破潰シ寬永通寶波錢大ノ穴ヲ作り惡臭ノ膿ヲ漏シ穴裏洞狀ニシテ嫩紫色ヲ呈スルハ前腹壁ノ者及肘關節ノ者ニ同シ爰ヲ以テ七月中旬當院ニ來リ治ヲ乞フ依テ之ヲ診スルニ所見左ノ如シ

〔現在症〕（觀診）体格中等ナレモ現狀ニ就テハ瘰癧ス皮膚枯瘦シ糙粗トナリ色澤ヲ失ス患部ハ第一左前腹壁胃部ニ於テ方二寸計ノ嫩紫色部アリテ二三ノ小孔作り空洞様ニシテ肉芽ヲ發生セス惡臭ヲ放ツ膿ヲ洩セリ多量ス而シテ固結部ハ橫徑五寸五步幅徑四寸步ナリ第二ノ者ハ背部第六背椎上ニ位置ヲ占メ長徑三寸計幅徑二寸計ノ浸潤性潮紅ヲ呈シ寬永通寶波錢大

ノ破潰孔アリ孔縁嫩紫色ヲ呈シ孔内ハ空洞狀ニシテ肉芽ヲ發生セス惡臭
ノ膿ヲ漏セリ第三。左右肩胛部ニハ長徑三寸幅經二寸計ノ潮紅部アリ硬結
ヲク破潰セス第四。季肋部ノ者及第五。腸骨右前上棘ノ者ハ長サ一寸計ノ楕
圓形潮紅部ヲ呈シ第三ノ者ト同シク硬結破潰セス第六。肘關節部ノモノハ
破潰シ潰瘍面ハ嫩紫色ニシテ凹凸不整不賈ノ肉芽ヲ發生シ惡臭ノ膿汁ヲ
漏セリ(觸診)前腹壁ノ者ハ之レヲ觸レハ結固シ壓ヲ増セハ疼痛ス

(自覺症)食欲不振身體倦怠ナルノミ而シテ患部ハ凡テ疼痛ス

其他問診スルニ嘗テ黴毒ニ罹リシヲナク水脈腺ヲ觸ルモ目下固結腫張
ヲ見サレモ其外觀ト肘關節部ノ發生部位ヲ以テ梅毒性ナラン乎ト診シ治
方ヲ試ムルヲ左ノ如シ

(治方及經過)則チ七月十二日試ミニ驅黴法ヲ施シ水銀軟膏二〇ヲ塗擦ト
シ沃剝一〇ヲ内服トシ兼テ二%ノ鹽剝水ノ含嗽ヲ爲シテ口内及齒齦炎ヲ
豫防シ破潰部ニハ赤降永膏ヲ貼シテ刺戟ヲ與テ其性ノ肉芽發生ヲ計リ浸
潤潮紅シタル部ニハ水銀軟膏ヲ別ニ貼セシメタリ此ノ如ク治法ヲ施シ經

過セシカ七月下旬ニ至リ背部及肘關節ノ潰瘍ハ次第ニ内部ニ肉芽ヲ發生
 シ空洞平癒シ破潰部ハ小トナリ洩膿減ス八月中旬ニ至リ諸ノ固結及潮紅
 部ハ減少シ就中右腸骨前上棘ノモノ及季肋部ノ者ノ如キハ殆ト消散シタ
 レル左右肩胛部ノ者ハ大豆大ノ破潰面ヲ呈シ此時ニ至テハ肘部腹壁部及
 背部ノ者ハ赤降汞膏ヲ貼スルルハ疼痛ヲ發スルヲ以テ沃度保爾謨軟膏ニ
 變法ス蓋シ此頃前腹部ノ空洞内ニモ多少肉芽ヲ發生シ快方ノ狀アリ爾他
 季肋部及腸骨棘部ノ者ニハ膏藥ヲ貼セサルニ至ル九月上旬ニ及ンテハ背
 部第六背椎部ノ者ハ殆ト治癒シ表皮ヲ作り九月上旬ノ末八日九日項八日九日ニ至テ
 ハ肘關節部モ表皮ヲ發生シ洩膿セス九月十四五日頃ニ在テハ左右肩胛ノ
 潰瘍モ治シ潮紅消失シ廿日ニ至リ尙ホ存スルハ前腹壁ノ潰瘍ノミナリ然
 レモ此潰瘍モ大方治途ヲ經テ僅カニ穿孔部ヲ遺存シ微ニ潮紅部ヲ目撃ス
 而シ此間二ヶ月餘ハ全ク沃剝ニ水銀塗擦法ヲ施シタリ而シ目下前腹壁部
 ニ千倍ノ昇汞液ヲ菴法ス又タ身体ノ疲勞ハ全ク去リ食欲亢進シ神思爽快
 癰瘦セシ狀ハ大方恢復セリ